ENCYKLOPEDIA LEŚNA

antraknoza

(fitopatologia leśna), plamistość zgorzelowa, patogen Apiognomonia errabunda (Roberge ex Desm.) Höhn. (Ascomycota, Sordariomycetes, Sordariomycetidae, Diaporthales). Poraża platany, buki, dęby, lipy i klony. Wiosną na młodych liściach pojawiają się zielonożółte przebarwienia, które z czasem brunatnieją. W zależności od gospodarza przebarwienie przyjmuje różne kształty. U platana przebiega wzdłuż nerwów. Na liściach lipy plamy mają różne kształty i posiadają ciemne obwódki. Przebarwienia mają tendencje do rozszerzania się i łączenia. W efekcie liście zamierają i przedwcześnie opadają. Porażeniu mogą ulęgać także ogonki liściowe i pędy. Chorobie sprzyja wilgotny i niezbyt ciepły kwiecień i maj. Ochrona dotyczy szkółek - opryski preparatami chemicznymi i wygrabianie i niszczenie porażonych liści.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Sinclair W., A., Lyon H., H., Johnson W., T., 1987. Disease of trees and shrubs. Cornell University Press, Ithaca and London. Mańka K., 2005. Fitopatologia Leśna. Wydanie VI zmienione i poprawione. PWRiL Warszawa, CABI Bioscience Databases, Index Fungorum,