ENCYKLOPEDIA LEŚNA

cień asymilatów

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), cień asymilatów widoczny jest jako strefa martwego drewna (z obumarłym łykiem) położonego po dolnej stronie dużych ubytków powierzchniowych i wgłębnych. Z uwagi na przebieg wiązek sitowych z dala od krawędzi rany niemożliwe jest zalewanie rany tkanką przyranną – kalusem, co prowadzi do powstawania martwic. Opisywana sytuacja ma miejsce przy cięciu grubych gałęzi, przy rozłamaniach pni powstałych przy niewłaściwie prowadzonych cięciach oraz przy pozostawieniu na pniu tylców po odciętych gałęziach. Takie uformowanie rany uniemożliwia rozwój tkanki kalusowej i prowadzi do powstania zgnilizn drewna, a w dalszej kolejności, ubytków wgłębnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielęgnacja drzew. Legraf, Warszawa.
Haller J. 1957. Tree care. The Macmillan Company, New York.
Haller J. 1977. Tree care. Theodore Audel & CO, Indianapolis.
Shigo A.L. 1991. Modern arboriculture: a systems approach to the care of trees and their associates. Shigo and Trees, Associates, Durham (New Hampshire).

ENCYKLOPEDIA LEŚNA

